

HABLAR DE
SIDA ES
PREVENIRLO



Prevención de VIH en adolescentes

Dra. Francisca Salas Pacheco

PEDIATRA CON MENCIÓN EN ADOLESCENCIA

PRESIDENTA RAMA ADOLESCENCIA

SOCIEDAD CHILENA DE PEDIATRÍA

CONFLICTOS DE INTERÉS

- NINGUNO




Infecciones de Transmisión Sexual

- Las tasas mas elevadas de se reportan entre 20 y 24 años de edad, seguidos por los adolescentes entre 15 y 19 años.
- El grupo de personas mas vulnerables para contraer VIH enfermedad son los adultos jóvenes.
- Se estima que el 28 % de las adolescentes serían positivos a una ITS y que una de cada tres mujeres, con vida sexual activa menor de 20 años, está infectada por VPH.

ONUSIDA, 2014

Atienzo E, et al. Salud Pública Mex. 2011.

Cambio porcentual en nueva infecciones por VIH en adultos (15 años o más), de 2000 a 2015




Fuentes: Estimaciones de ONUSIDA e 2016; Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, Islandia, Irlanda, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia, Reino Unido, Albania, Andorra, Bosnia y Herzegovina, Macedonia, Israel, Montenegro, San Marino, Serbia, Suiza y Turquía); Centros para la Prevención y el Control de las Enfermedades. Informe de vigilancia del VIH, 2014; vol. 26. <http://www.cdc.gov/hiv/library/reports/surveillance/>. Publicado en noviembre de 2015. Consultado [10 de julio de 2016]. Russian Federation 2016 Global AIDS Response Progress Reporting submission. China 2016 Global AIDS Response Progress Reporting submission.

VIH

- Se ha logrado un pronunciado descenso en la cifra anual de nuevas infecciones por el VIH entre la población infantil.
- El descenso en el numero de nuevas infecciones por VIH entre la poblacion adulta-joven se ha ralentizado, lo que supone una amenaza al avance para poner fin a la epidemia de sida.


**Nueva infecciones por VIH en adultos
(15 años o más), mundial, 2000–2015**



— Nuevas infecciones por el VIH ● Objetivo

Fuente: Estimaciones de ONUSIDA 2016

**Nueva infecciones por VIH en niños
(0–14 años), mundial, 2000–2015**



— Nuevas infecciones por el VIH ● Objetivo

Fuente: Estimaciones de ONUSIDA 2016



Nuestra región

- El Caribe es el área con la segunda tasa más alta de prevalencia de SIDA en el mundo, después de Africa Subsahariana.
- Hoy hay aproximadamente 420,000 adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años que viven con VIH/SIDA están en America Latina y el Caribe.
- En la mayoría de los países de la region, el acceso a los servicios de salud para los adolescentes y jóvenes sigue siendo inadecuado.
- En Barbados y el Caribe Oriental se reporta una incidencia de VIH seis veces mas alta entre las mujeres de 15 y 24 años.




Estás leyendo:

Menores de 14 años que usan anticonceptivos se triplican en

En 2016, un total de 23.475 jóvenes ingresaron al programa estatal de regulación de fecundidad, un 239% más que las 6.917 de 2011. Expertos dicen que mayor control explicaría baja del embarazo adolescente y que precocidad está asociada a estratos más bajos.

Anticoncepción de emergencia entregada a menores de 19 años:




Nacidos vivos entre madres 10-14 años





RESULTADOS CONFIRMACIÓN DE INFECCIÓN POR VIH EN CHILE, 2010 - 2015.

Figura 1: Casos confirmados de VIH en mayores a 13 años (inclusive) y tasas*, por año. Chile, 2010-2015.



*Tasas por 100.000 habtes. en base a Proyección de Población para ≥ 13 años INE, 2016.
Fuente: Laboratorio Referencia VIH, Instituto de Salud Pública.

Informe Nacional: evolución de la infección por VIH/SIDA Chile 1984-2012

Rev Chil Infect 2015


- Los adolescentes (15-19 años) presentan uno de los mayores aumentos porcentuales a través del tiempo, incrementando en el último quinquenio 72% respecto del anterior.

Tabla 1. Tasa de notificación de VIH/ SIDA según grupos de edad y quinquenio. Chile, 1988-2012*


Edad	1988-1992		1993-1997		1998-2002		2003-2007		2008-2012	
	n	Tasa*								
0-4	19	1,3	47	3,2	65	4,9	70	5,7	45	3,6
5-9	2	0,2	5	0,3	11	0,7	13	1,0	23	1,9
10-14	3	0,3	5	0,4	8	0,5	11	0,7	17	1,3
15-19	70	5,7	81	6,9	191	14,4	227	15,5	397	26,7
20-29	703	28,0	1.404	56,5	1.851	76,7	2.085	83,6	3.635	130,6
30-39	562	28,2	1.386	58,2	2.280	90,7	2.305	93,0	3.167	131,6
40-49	274	19,9	564	34,9	1.014	51,4	1.373	58,4	2.024	81,6
50-59	95	10,0	244	21,9	436	32,9	546	35,0	873	45,8
60-69	42	6,3	73	9,5	119	13,9	169	16,7	284	23,5
70 y más	9	1,8	16	2,7	31	4,3	45	5,2	54	5,4
Total	1.779	13,5	3.825	26,6	6.006	39,0	6.844	42,1	10.519	61,5

Fuente: Formulario caso VIH/SIDA, Depto Epidemiología. MINSAL. *Tasa por cien mil hab.

Uso de método preventivo en la última relación sexual y realización del test del SIDA



El 77% de las y los jóvenes iniciados sexualmente reportan haber utilizado algún método preventivo en su última relación sexual.



Minsal, 2017


Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2012-2015, INJUV.



Uso de preservativos

(% uso últimos 12 meses) por sexo y tramos de edad

P8.6 Durante los últimos 12 meses, ¿usó Ud. o su pareja preservativo o condón en sus relaciones sexuales?
(sobre el total de personas que han tenido una relación sexual en los últimos 12 meses)



Nota: *Se omiten categorías "Casi siempre" "A veces", "No sabe" y "No responde"

Minsal, 2017




Objetivos Mundiales

- La Asamblea General de las Naciones Unidas acordó en junio de 2016 poner fin a la epidemia del sida para 2030.
- Esto exige una respuesta acelerada para lograr tres hitos para el año 2020:
 - Reducir el número de nuevas infecciones por el VIH en todo el mundo a menos de 500 000 para el año 2020.
 - Reducir la cifra de muertes relacionadas con el sida en todo el mundo a menos de 500 000 para el año 2020.
 - Eliminar el estigma y la discriminación relacionados con el VIH para el año 2020.

Prevención de VIH y Adolescencia

- 2001: La Asamblea General de ONU incluyó como objetivo reducir la prevalencia de VIH en población de 15- 24 años en un 25% para el año 2010 y aumentar el acceso a servicios y actividades de prevención a un 95%.
- 2015: ONU en el contexto de los Objetivos del Milenio enfatiza la igualdad, el empoderamiento y compromiso con los adolescentes y el fortalecimiento de los registros para avanzar en el trabajo de la agenda estipulada.
- De los Objetivos de Desarrollo Sustentables para el 2030, 3 de ellos están dirigidos a tratar a la salud sexual y reproductiva y acceso a servicios de salud apropiados como derecho humanos.



Inicio sexual precoz
Múltiples parejas sexuales
Actividad sexual sin protección'

- *Adolescentes
- **<16 años
- **Bajos recursos
- **Diversidad sexual
- **Migrantes
- **Consumidores de OH y drogas

CINCO PILARES DE LA PREVENCIÓN



Metas de prevención de la Asamblea General de las Naciones Unidas

